


新北市學校處理傳染病標準作業流程

106年5月4日新北教體衛字第1060794728號函



校園防治傳染病

發現疑似傳染病個案

通知緊急聯絡人

確認傳染病

回歸校園傷病處理流程

校園常見傳染病注意事項：

- | | |
|-----------|---------|
| 1. 腸病毒 | 7. 紅眼症 |
| 2. 流感 | 8. 頭蝨 |
| 3. 水痘 | 9. 疥蟲 |
| 4. 登革熱 | 10. 結核病 |
| 5. 茲卡病毒 | 11. 百日咳 |
| 6. 病毒性腸胃炎 | (如附件) |

啟動校園防疫機制

立即通報
1. 校安通報系統
2. 新北市疑似傳染病通報系統

加強衛教宣導

清查是否有群聚擴散

校外群聚感染

校內群聚感染

護理師通報衛生局(所)

衛生局(所)對校外群聚場所進行衛教宣導、環境查核及檢體採檢。

校方配合衛生局(所)進行校園內環境消毒、衛教宣導、環境查核及檢體採檢。

罹病個案追蹤管理

1. 個案依醫生建議治療或在家休養
2. 避免個案參加隔宿校外教學等團體活動

經醫院或衛生單位確認可上學

列入個案追蹤管理

學校正常作為環境衛生管理

學校環境整頓

1. 定期大掃除。
2. 垃圾處理力求減量、回收再利用。
3. 加強學生打掃各式登革熱孳生源。
4. 定期清理小黑蚊幼蟲棲地。
5. 避免流浪貓狗與老鼠於校內聚集。
6. 發現紅火蟻，應立即通報。

校園環境噴藥消毒

1. 每學期噴藥消毒一次為原則。
2. 天然災害過後，浸水嚴重地區及傳染病流行時期，可視實際需要另行安排消毒。

切斷傳染源

校方加強教室(含辦公室、廁所等)校園環境消毒。

1.腸病毒 ✧ 症狀：常引起之症狀為手足口病、疱疹性咽峽炎。 ✧ 傳染途徑：經由腸胃道或呼吸道傳染。 ✧ 潛伏期：感染 2-10 天會出現症狀。 ✧ 校方注意事項：個案發病日起算 7 天(含假日)應停止去學校上課。
2.流感 ✧ 症狀：常引起之症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等。 ✧ 傳染途徑：主要在密閉空間中經由飛沫傳播，亦可能經由接觸傳染。 ✧ 潛伏期：約半天至 4 天。 ✧ 校方注意事項：個案解除症狀後 24 小時後復課。
3.水痘 ✧ 症狀：初期症狀包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂。 ✧ 傳染途徑：可經由皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳染，接觸到水疱液或黏膜分泌物也可能感染。 ✧ 潛伏期：約 1~4 天，一般為 2 天。 ✧ 校方注意事項：個案發病時，應停止去學校上課，在家休息到水泡結痂，且最好由醫師評估傳染力已大幅降低後再復課。
4.登革熱 ✧ 症狀：每個人症狀不同，從輕微症狀到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象。 ✧ 傳染途徑：受感染之埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬。 ✧ 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為 3 至 8 天(最長可達 14 天)。 ✧ 校方注意事項：個案生病期間儘量在家休息，後續須配合衛生局、環保局作環境噴藥處置。且校園環境要澈底落實「巡、倒、清、刷」： 巡：經常並仔細巡檢居家室內、外可能的積水容器。 倒：將積水倒掉，不要的器物予以分類或倒放。 清：減少器具，留下的器具也應澈底清潔。 刷：去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。
5.茲卡病毒 ✧ 症狀：典型的症狀是發燒、紅疹、關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎等，其他常見症狀為頭痛、後眼窩痛、厭食、腹痛及噁心等。 ✧ 傳染途徑：由茲卡病毒引起的急性傳染病，主要是經由蚊子叮咬傳播。 ✧ 潛伏期：約 3 至 7 天後（最長可達 12 天）開始發病。 ✧ 校方注意事項：病人發病當天至發病後 11 天，或血液病毒核酸檢驗陰性之前，應避免被病媒蚊叮咬。後續須配合衛生局、環保局作環境噴藥處置。
6.病毒性腸胃炎 ✧ 症狀：主要症狀是水瀉和嘔吐，也可能會有頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀。 ✧ 傳染途徑：主要透過糞口途徑傳播。

✧ 潛伏期：通常感染後 1~3 天開始出現腸胃炎症狀，症狀可以持續 1~10 天。 ✧ 校方注意事項：個案症狀解除後 48 小時即能復課。
7.紅眼症 ✧ 症狀：眼睛紅腫不適、怕光，伴有水性分泌物，偶有輕度發燒。 ✧ 傳染途徑：傳染途徑為「接觸傳染」，如游泳池之污水，污染之公用物品，如毛巾、面盆等。 ✧ 潛伏期：只需 6-12 小時，即可發病。 ✧ 校方注意事項：須注意學生之分泌物，避免感染到其他學生。
8.頭蝨 ✧ 症狀：常見的症狀為頭皮發癢，有時會造成過敏、睡不安穩、失眠、抓傷頭皮等情形。 ✧ 傳染途徑：透過人與人接觸時，頭對頭或頭髮對頭髮的接觸傳播；間接使用患者用過的梳子、衣物、帽子、毛巾、有絨毛的玩偶也可能被傳染；躺在患者睡過的枕頭、床鋪也有感染頭蝨的風險。 ✧ 潛伏期：初次感染後，約需 4 至 6 週才會產生過敏反應。 ✧ 校方注意事項：應提醒學生家長注意是否家中有其他人感染，並一起治療，持續後續追蹤。
9.疥蟲 ✧ 症狀：典型症狀為皮膚劇癢，至夜間時更為嚴重。 ✧ 傳染途徑：接觸患者的皮膚、衣物、床鋪或傢俱皆可能被傳染，疥蟎在成人間常透過身體親密接觸傳染。 ✧ 潛伏期：人第一次感染，約 2 至 6 週才會出現症狀；若為二次感染，症狀約 1 至 4 天就會出現。 ✧ 校方注意事項：應提醒學生家長注意是否家中有其他人感染，並一起治療，持續後續追蹤。
10.結核病 ✧ 症狀：臨床上病人常見的症狀有咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振，發燒、咳血等。如有疑似結核病之症狀(如咳嗽超過兩週)，宜儘速就醫。 ✧ 傳染途徑：經由飛沫傳染。 ✧ 潛伏期：大約須 4~12 週 ✧ 校方注意事項：須配合衛生單位進行接觸者檢查及後續追蹤。
11.百日咳 ✧ 症狀：臨床症狀最明顯的特徵為病患的咳嗽聲。 ✧ 傳染途徑：主要是由飛沫傳染，病菌通常是由兄弟姐妹或父母帶回家散播給年齡較小的孩子。 ✧ 潛伏期：一般是 9~10 天，範圍為 6-20 天，惟很少超過 14 天。 ✧ 校方注意事項：須配合衛生單位進行接觸者檢查及後續追蹤。